



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 09-04-2010

Albicocco

Oidio con azione collaterale su apiognomonìa

Indar cc. 100

Oidio

Microthiol Disperss gr. 300

Corineo

Silfur WDG gr. 180 non miscelare con Indar.

oppure

TMTD 50 SC cc. 250-270

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

Anarsia e Ricamatori con azione collaterale sui curculionidi

Steward gr. 16,5

oppure

Avaunt cc. 33

trattare a caduta petali

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miridi

Biensur oppure Trebon star cc. 100

In caso di infestazione

Concimazione fogliare

Miglioramento allegazione ed aumento pezzatura

Alga Vital cc. 150 oppure BM 86 cc. 250 Eseguire due interventi uno a caduta petali e uno a scamicatura.

oppure

Benefit PZ cc. 300+MC Cream cc. 150 Tre interventi a distanza di 10 gg. dall'inizio della scamicatura.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Concimazione granulare

Caduta Petali

Eeguire una concimazione granulare con

Nitrocap ql. 1,5 per Ha oppure Multicrop 14-0-28 ql. 2,5-3/Ha

Impiegare il multicrop se non si è eseguita la concimazione potassica a caduta foglie. E' fondamentale intervenire in maniera tempestiva poiché in questa annata il periodo di tempo fra caduta petali ed indurimento nocciolo sarà molto breve.

Pesco

Cidia Molesta

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.

oppure

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Tripidi

Etifos ME cc. 350 oppure Rufast cc. 60 Trattare a caduta petali

Bolla

Merpan 480 SC cc. 250 oppure Comet cc. 150

Trattare a caduta petali, non miscelare il Comet con l'Etifos ME in quanto la miscela è fitotossica.

Oidio

Domark cc. 90 oppure. Thiocur Forte/Systane cc. 150 Trattare a scamicatura.

Miridi

Trebon Star/Biensur cc. 100 Trattare a scamicatura

Eulia

Iniziato il volo, installare le trappole.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eeguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicatura.

Resistenza agli stress termici (alte temperature in fioritura ed escursioni termiche elevate che possono compromettere la vitalità del polline-riduzione della durata del budello pollinico nella fase di fecondazione del fiore)

Alga vital/Mc Cream cc. 100-150 *oppure* Alga Mix cc. 250



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Monilia

Switch gr. 30 *oppure* Signum gr. 75

Afidi Tentredini

Confidor Oteq/Difloron cc. 50 Trattare a caduta petali

oppure

Epik gr. 100

Tripidi

Rufast cc. 60

Allegagione

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

I prodotti a base di ferro durante l'epoca della fioritura limitano la fase di crisi post fiorale, favorendo una migliore allegagione.

Cidia Funebrana

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.

Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eseguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicatura.

Pero

Ticchiolatura

Silfur gr. 180 Delan gr 100 per la varietà William e Kaiser

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere **Score o similari** cc. 15

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 Per varietà sensibili Abate, Conference, Decana, ecc..., in caso di piogge prolungate aggiungere Folicur SE cc. 400 oppure Folicur WG gr. 70.

Maculatura

Switch gr. 80 oppure Rovral Flo cc. 150 Trattare a caduta petali, il Rovral Flo è fitotossico su decana, entrambi i prodotti sono efficaci anche su marciume calicino.

Tentredini

Epik gr. 100 Trattare a caduta petali.

Eriofide

Pride cc. 75 Trattare dove non è stato eseguito Polithiol a rottura gemme.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Psilla-Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 70+Eko Oil cc. 100

oppure

Dynamec/Zamir cc. 70+Break Thru/Tegoplant cc. 30

Attenzione evitare l'impiego di Eko Oil, dove si è impiegato TMTD da meno di 8-10 giorni.

Ricamatori

Steward gr. 16,5 oppure Avaunt cc. 33 oppure Prodigy gr. 40 Ove non si è trattato in prefioritura trattare a caduta petali.

Concimazione fogliare

Trattare a caduta petali.

Miglioramento allegagione

Boro elle 11 cc. 150

oppure

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Trattare a caduta petali

Prevenzione clorosi ferrica (concimazione fogliare)

DL 6 cc. 150 oppure Librel FE gr. 50 oppure Ferrochelato L6 cc. 200 oppure Fertileader cc. 200

utilizzare su tutte le varietà, tranne Decana. Questa pratica non risolve totalmente il problema ma va ad integrare gli interventi radicali.

Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

Occorre affrettarsi nella applicazione di questi fertilizzanti per evitare l'insorgenza di clorosi in fioritura.

Melo

Ticchiolatura

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Score o similari cc. 15.

Afidi

Tepeki gr. 14 (140 gr./Ha) Trattare in prefioritura.

Ricamatori

Steward gr. 16,5 oppure Avaunt cc. 33 oppure Prodigy gr. 40 Trattare in prefioritura.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Miglioramento allegagione

Boro elle 11 cc. 150

oppure

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Carpocapsa

A fine prossima settimana installare gli erogatori per la confusione sessuale.

Vite

Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

Oppure

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

Viti di due anni

Basta lt 4-5

Viti di un anno

Reglone lt. 3-3,5+Gallery lt. 0,750+Kerb flo lt. 1,5 per ha trattato.

Diserbo Piante da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Kaki

Sesia

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.

Actinidia

Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/HI

oppure

Kytex gr. 400/HI+Sarplant gr. 50

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Grano

Fase Fenologica: inizio levata

Concimazione

Doppio Intervento:

Nitrocap 33,5-0-0 ql. 1,5-2 per Ha Intervenire appena possibile

Successivamente

Amiplus ql 2 per Ha ad inizio levata.

Diserbo

Dicotiledoni Comuni

Granstar 50 SX gr. 20+Trend cc. 500

Dicotiledoni e Galium

Ariane II lt. 2,5-3 oppure Manta Duo lt. 1,50

Dicotiledoni Veronica e Fumaria

Granstar Power SX gr. 1090 per Ha (ultima settimana di impiego)

Graminici

Avena, Alopecuro, Poa

Topik 80 cc. 600-750

Avena Loietto Poa e Alopecuro

Traxos cc. 250+Adigor lt. 1,5

Graminacee e Dicotiledoni

Puma Gold lt 1,25+Biopower lt. 1

oppure

Atlantis cc. 500+Mextrol plus lt. 1,5+Biopower lt. 1 Non impiegare su grano miati.

oppure

Atlantis cc. 500+Grantar Power gr. 600-700+Biopower lt. 1

E' sconsigliato utilizzare Puma Gold ed Atlantis in quegli appezzamenti dove si intende effettuare colture di secondo raccolto.

Orzo Graminacee

Axial lt. 0,450+Adigor lt. 1,5 Graminicida utilizzabile su Orzo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Difesa

Septoria

Agorà lt. 0,6-1 oppure Amistar xtra lt. 0,6-1

I grani più colpiti da septoria sono tutti i grani bianchi tra i quali Apoteosi, Geronimo, Mieti, A416, Nobel, e i grani duri, Latinur, Levante, Orobel, S. Carlo, fra i grani rossi Artico, Kalango, Quality, mentre le varietà Bologna e Bolero si presentano ad oggi esenti da sintomi. I sintomi risultano più evidenti nei grani seminati precocemente, entro il 20-25 Ottobre.

Cipolla

Diserbo di pre-emergenza

Basta lt. 3,5-4

Diserbo post-emergenza

Cipotril/Iotril cc. 150-200

+

Activus/Penthium lt. 0,5

Con cipolla alla fase di emergenza-frusta.

Cipolla autunnale

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha

Diserbo

Terminal/Fuego cc. 100-150/ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

Graminacee

Leopard/Elegant lt. 1,25-1,50 *oppure* Agil lt. 1



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Bietola Portaseme **Diserbo post-emergenza**

1° intervento

Betanal expert lt. 1,5-2

+

Razor kg. 1-1,5

+

Pyramin FL lt. 0,7-1

+

Venzar gr. 100-150

+

Olio Bianco lt. 0,3-0,6

Cuscuta

Kerb Flo lt. 1 Trattare in presenza dell'infestante.

Barbabetola da zucchero

Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 0,700-1

+

Razor Kg. 0,500

+

Venzar gr. 50-100

+

Eko Oil lt. 0,300-0,500

In caso di presenza di ammi majus utilizzare Safari gr. 40 al posto di venzar; con Safari utilizzare l'olio a cc. 300

Cuscuta

Kerb Flo lt. 0,5-0,7 Trattare in presenza dell'infestante.

Pisello Secco e Verde

Diserbo pre-emergenza

Activus/Pentium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1-1,5



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Diserbo post-emergenza

Basagran lt. 0,5-0,7

+

Altorex lt. 0,5

In presenza di graminacee aggiungere Agil lt. 0,6-0,8 *oppure* Leopard/Elegant lt. 1,5.

Diserbo letti di semina

Roundup Bioflow lt. 3-5 per Ha

+

Erbifast lt. 2-4

Girasole

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10 /Ha

Diserbo Pre emergenza

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 2

oppure

Dual gold lt. 0,7-1

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

oppure

Terminal/Fuego lt. 0,5-0,6

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Miscela valida in presenza di Amni Majus.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Mais

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 Kg. 10-12

oppure

Zelig GR kg. 10-12

Diserbo di Pre-Emergenza

Bolero Micromix lt. 3,5-4

oppure

Primagram gold lt. 4-4,5

oppure

Primagram gold lt. 3,5

+

Merlin expert lt. 07-1

Miscela valida in presenza di Amnj majus e Abutylon.

Sorgo

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10-12

Pre-emergenza

Non esiste attualmente nessun diserbo registrato utilizzabile in pre-emergenza.

Post emergenza precoce

Primagram gold lt. 3 ha.

Pomodoro

Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eseguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

Patata

Disinfestante pre ricalzatura

Force kg. 10 per Ha

Diserbo Post-ricalzatura

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1,5-1,8

+

Feinzin/Mesozin kg. 0,40-0,50

+

Command cc. 180-200

Soia

Diserbo di pre-emergenza

Dual Gold lt. 0,7-1

+

Afalon/Linuron Sipcam lt. 0,7-1

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.